

【成分】2カプセル中

発熱・のどの痛み等に

イブプロフェン……………150mg

くしゃみ・鼻みず・鼻づまりに

マレイン酸カルピノキサミン…2.5mg

せき・たんんに

ジヒドロコデインリン酸塩……………6mg
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩…20mg
グアヤコールスルホン酸カリウム…80mg

無水カフェイン……………25mg
チアミン塩化物(ビタミンB1(硫黄塩))…8mg
リボフラビン(ビタミンB2)……………4mg

添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、酸化チタン、黄色5号、ラウリル硫酸 Na、セラチン

【効能】

かぜの諸症状（発熱、のどの痛み、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん）の緩和

【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水またはお湯で服用してください。

年齢	15才以上	15才未満
1回量	2カプセル	服用しないこと
服用回数	1日3回	

製造販売元

日本OTC製薬株式会社

〒103-0001 東京都中央区日本橋
小伝馬町13-4 共同ビル3階

お客様相談室

☎0120-123456

9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.jsmi.jp/>

副作用被害救済制度の問合せ先


電話 0120-149-931

○○○○○

使用期限
(西暦年月)

○○○○○

製造番号



000000100000000



第2類医薬品

○△かぜ薬 総合かぜ薬

医師・薬剤師にご相談ください
医師・歯科医師の治療を受けている人、妊娠している人、高齢者、アレルギー体質の人、高熱や排尿困難のある人、胃・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・クローン病にかかったことのある人

○△かぜ薬 総合かぜ薬
第2類医薬品
かぜによる発熱・のどの痛みなどに



イブプロフェン配合

かぜによるのどの痛み

発熱
かぜによる

○△かぜ薬 総合かぜ薬
外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、開封された形跡がある場合は使用しないでください

○△かぜ薬 総合かぜ薬

第2類医薬品

かぜによる発熱・のどの痛みなどに