


ノボラピッド®ミックス製剤は、お使いになる前によく混ぜてください。

なぜ混ぜなければいけないの？

- ノボラピッド®ミックス製剤は、基礎インスリンと追加インスリン両方のインスリンを補う成分が配合されています。
- 2つの成分をバランスよく補充するため、使う前によく混ぜる必要があります。


〈作用動態イメージ〉



どのように混ぜればよいの？

室温に戻し、十分に混ぜてください。

注射液が均一に白く濁ったことを確認してから注射してください。



※ 上記操作で不十分な場合は、**A**と**B**を繰り返し行ってください。

注) ヒトインスリン混合製剤とは混ぜ方が異なります。ノボラピッド®ミックス製剤では**A**の方法が必要になります。

ノボラピッド[®]ミックス製剤を使用する際の注意事項

●食事の直前に注射してください。

●注射し忘れたり、注射量を間違えた場合は
すぐに主治医または薬剤師に相談してください。



※自分の判断で注射量や注射の時期を変えないでください。

●次のようなときは、低血糖に注意してください。

食事をとらなかったとき

いつもより激しい運動をしたとき

あやまって多く注射したとき



●低血糖症状が起きたら、すぐに主治医に連絡してください。

けいれん、昏睡

急に起こる強い空腹感、脱力感、発汗、手足のふるえ、目のちらつき、頭痛、ぼんやりする、ふらつく



※高所での作業や自動車の運転などを行うときには、低血糖をおこすと事故につながりますので十分注意してください。

●注射部位に次のような異常を感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。

注射した場所が赤くなる・はれる・硬くなる・かゆくなる・へこむ・ふくれる、
注射した場所に感染症を起こし痛みと熱がでる



●妊娠中、授乳中の方は主治医にそのことをお伝えください。

保存のしかた

未使用のものは、**冷蔵庫**で保存してください。使用中のものは室温で保存して、**4週間以内**に使用してください。保管の際は**横向き**に置いてください。

製剤の取り違えにご注意ください。

ノボラピッド[®]ミックス製剤は、
注入ボタンまたはカラー帯の色で識別できます。

ロイヤルブルー



ノボラピッド[®]
30ミックス

ピンク



ノボラピッド[®]
50ミックス

ベージュ



ノボラピッド[®]
70ミックス